

	DOCUMENTO SUPORTE	Código: DS-RC-0002
		Revisão: 2
	BIÓPSIA DE PRÓSTATA	Data: 18/09/2024
		Página 1 de 4

PREPARO:

- Por 5 dias antes da realização do exame o paciente não poderá fazer uso de nenhum tipo de anti-flamatório, anticoagulante ou aspirina.
- Tomar um (01) comprimido de Ciprofloxacina 500mg, doze (12) horas antes do exame.
- Tomar dois (02) comprimidos de Ciprofloxacina 500mg, uma (01) horas antes do exame.
- Tomar um (01) comprimido de Ciprofloxacina 500mg, doze (12) horas após o exame.
- Fazer um Fleet-enema ou Phosfo-enema, uma (01) hora antes do exame.
- Colher exame: Coagulograma (no máximo 2 dias antes do procedimento).
Apresentar o resultado no ato do cadastro.

DIA DO EXAME:

- vir acompanhando.
- Vir de jejum de 8 horas para a anestesia (beber água somente a quantidade necessária para tomar os comprimidos de Ciprofloxacina).
- Apresentar exames anteriores de próstata como: Ultrassom, Ressonância, PSA.

DURANTE O EXAME:

- Anestesia local: A biópsia de próstata geralmente é feita com anestesia local para minimizar o desconforto.

Elaborado por: DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI	Revisado por: SEBASTIANA BORGES	Aprovado por: SEBASTIANA BORGES Data: 18/09/2024
Documento exclusivo - Proibida a reprodução.		CIMRAD

	DOCUMENTO SUPORTE	Código: DS-RC-0002
		Revisão: 2
	BIÓPSIA DE PRÓSTATA	Data: 18/09/2024
		Página 2 de 4

- Posicionamento: O paciente fica deitado de lado ou com as pernas elevadas, dependendo da abordagem utilizada (transretal ou transperineal).
- Ultrassonografia: O médico geralmente utiliza o ultrassom transretal para guiar a coleta de amostras precisas da próstata.
- Dispositivo de biópsia: Um pequeno dispositivo é utilizado para coletar fragmentos da próstata. Esse procedimento é rápido, mas pode causar desconforto momentâneo.

APÓS A BIÓPSIA:

- Descanso: Após o procedimento, é recomendado descansar e evitar atividades físicas intensas por pelo menos 24 a 48 horas.
- Antibióticos: Continue tomando os antibióticos conforme prescrito, para prevenir infecções.
- Sintomas comuns: Pode haver sangramento leve na urina, fezes ou sêmen por alguns dias após a biópsia. Isso é normal, mas deve ser monitorado.
- Hidratação: Beba bastante água para ajudar na recuperação e para facilitar a eliminação de qualquer traço de sangue na urina.
- Monitoramento: Se ocorrer febre, dor intensa ou sangramento excessivo, entre em contato com o médico/ serviço da clínica no tel: [\(62\) 3261-0100](tel:(62)3261-0100) / [\(62\) 3091-6363](tel:(62)3091-6363) / [\(62\) 3773-2100](tel:(62)3773-2100) / [\(62\) 3085-7575](tel:(62)3085-7575), pois podem ser sinais de complicações, como infecção.

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Elaborado por: DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI	Revisado por: SEBASTIANA BORGES	Aprovado por: SEBASTIANA BORGES Data: 18/09/2024
Documento exclusivo - Proibida a reprodução.		CIMRAD

	DOCUMENTO SUPORTE	Código: DS-RC-0002
		Revisão: 2
	BIÓPSIA DE PRÓSTATA	Data: 18/09/2024
		Página 3 de 4

- Evite o uso de medicamentos anticoagulantes sem orientação médica após a biópsia.
- Siga todas as orientações do médico em relação a cuidados com a higiene, principalmente na área retal, se a biópsia foi transretal.

Seguir essas orientações ajuda a reduzir o risco de complicações e garantir uma recuperação tranquila.

Elaborado por: DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI	Revisado por: SEBASTIANA BORGES	Aprovado por: SEBASTIANA BORGES Data: 18/09/2024
Documento exclusivo - Proibida a reprodução.		CIMRAD

	DOCUMENTO SUPORTE	Código: DS-RC-0002
		Revisão: 2
	BIÓPSIA DE PRÓSTATA	Data: 18/09/2024
		Página 4 de 4

Elaborado por: DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI	Revisado por: SEBASTIANA BORGES	Aprovado por: SEBASTIANA BORGES Data: 18/09/2024
Documento exclusivo - Proibida a reprodução.		CIMRAD