

	DOCUMENTO SUPORTE	Código: DS-RC-0003
		Revisão: 2
	CORY BIOPSY	Data: 18/09/2024
		Página 1 de 3

PREPARO

ANTES DA BIÓPSIA (CORE BIOPSY):

- Informar o médico sobre medicamentos: É fundamental relatar todos os medicamentos que você está tomando, especialmente anticoagulantes e anti-inflamatórios (como aspirina ou ibuprofeno), pois eles podem aumentar o risco de sangramento. O médico pode orientar a suspensão temporária desses medicamentos.
- Exames pré-operatórios: Em alguns casos, o médico pode solicitar exames de sangue, como o tempo de coagulação, para garantir que o risco de sangramento é baixo.
- Higiene da área: Dependendo do local onde será feita a biópsia, você pode ser orientado a manter a área limpa e evitar o uso de cremes ou loções no dia do procedimento.
- Jejum: Para biópsias que requerem sedação ou anestesia, pode ser necessário um jejum de 6 a 8 horas antes do procedimento. Se a biópsia for feita apenas com anestesia local, o jejum normalmente não é necessário.

DURANTE A BIÓPSIA (CORE BIOPSY):

- Anestesia local: O procedimento geralmente é realizado sob anestesia local para minimizar o desconforto. O anestésico é injetado na área onde a amostra será retirada.
- Posicionamento: O médico posiciona o paciente de acordo com a área a ser biopsiada (seio, próstata, pele, entre outras). O procedimento é realizado com a ajuda de imagens, como ultrassonografia ou mamografia, para guiar a agulha até o local exato.
- Coleta de amostras: Uma agulha grossa é inserida na área-alvo para retirar pequenas amostras de tecido. O processo pode ser desconfortável, mas é geralmente rápido.

APÓS A BIÓPSIA (CORE BIOPSY):

Elaborado por: DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI	Revisado por: SEBASTIANA BORGES	Aprovado por: SEBASTIANA BORGES Data: 18/09/2024
Documento exclusivo - Proibida a reprodução.		CIMRAD

	DOCUMENTO SUPORTE	Código: DS-RC-0003
		Revisão: 2
	CORY BIOPSY	Data: 18/09/2024
		Página 2 de 3

- Cuidados com o local da biópsia: Pode haver um pequeno curativo ou bandagem sobre o local da biópsia. Mantenha a área limpa e seca conforme as orientações do médico. Retirar o curativo no dia seguinte ao procedimento e lavar com água e sabão (não é necessário colocarmicropore ou band-aid no local); pode aparecer equimose (roxo) no local da biópsia, que melhora em até 1 mês; não tomar aspirina/ AAS por pelo menos 2 a 3 dias após a biópsia; dormir com top de academia ou sutiã mais apertado para comprimir a mama.
- Repouso: Evite atividades físicas intensas nas primeiras 24 a 48 horas para reduzir o risco de sangramento ou inchaço no local da biópsia.
- Dor e inchaço: É comum sentir um leve desconforto ou notar um pequeno hematoma na área da biópsia. Analgésicos simples, como paracetamol, podem ser usados para aliviar a dor, se necessário. Evite medicamentos anticoagulantes ou anti-inflamatórios sem orientação médica. Colocar gelo por cima do curativo por 20 minutos a cada 1 hora no dia do procedimento para diminuir o inchaço e o hematoma;
- Monitoramento de sintomas: Caso observe sinais de infecção (como febre, vermelhidão ou calor excessivo no local da biópsia) ou sangramento excessivo, entre em contato com o médico.
- Resultados: Os resultados da biópsia podem demorar alguns dias ou semanas. O médico discutirá os achados e os próximos passos com base nos resultados.

Elaborado por: DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI	Revisado por: SEBASTIANA BORGES	Aprovado por: SEBASTIANA BORGES Data: 18/09/2024
Documento exclusivo - Proibida a reprodução.		CIMRAD

	DOCUMENTO SUPORTE	Código: DS-RC-0003
		Revisão: 2
	CORY BIOPSY	Data: 18/09/2024
		Página 3 de 3

Elaborado por: DIANNE CHIARELI NOWOGRODZKI	Revisado por: SEBASTIANA BORGES	Aprovado por: SEBASTIANA BORGES Data: 18/09/2024
Documento exclusivo - Proibida a reprodução.		CIMRAD